Liquide de rinçage oro-pharyngé (LROP)

Le LROP est un prélèvement non invasif indiqué pour la détection des portages et des infections à *Pneumocystis jirovecii*.

Technique :

Le LROP peut être effectué :

- Soit le matin à jeun avant tout soin buccal et lavage de dents
- soit à distance d'un repas et/ou d'un lavage de dents, donc soit en fin de matinée ou en fin d'après-midi

Rincer et bien gargariser la bouche avec 10 ml de sérum physiologique (0,9%) pendant au moins 30 sec à 1 min et recueillir le liquide de rinçage dans un récipient stérile (pot ECBU) bien identifié.

Références bibliographiques :

Durand-Joly I, Chabe M, Soula F, Delhaes L, Camus D, Dei-Cas E. Molecular diagnosis of *Pneumocystis* pneumonia. *FEMS Immunol Med Microbiol* 2005;45:405-10.

Durand-Joly I, Soula F, Chabe M, Dalle JH, Lafitte JJ, Senechal M, Pinon A, Camus D, Dei-Cas E. Long-term colonization with *Pneumocystis jirovecii* in hospital staffs: a challenge to prevent nosocomial pneumocystosis. *J Eukaryot Microbiol* 2003;50 Suppl:614-5.